

Über die Bildung von Isomeren bei sekundären Keton-Hydrazone.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
einer Hohen Naturwissen[schaftlichen Fakultät
der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Waldemar Buchner

aus Marktredwitz / Bayer. Ostmark

Tag der mündlichen Prüfung: 14. Mai 1937.

Buchdruckerei Robert Windsheimer, Erlangen-Bruck.

1937

1937/339

Referent: Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. M. Busch
Dekan: Prof. Dr. J. Schwemmle



IN DANKBARKEIT
meiner lieben Mutter


Inhaltsangabe.

	Seite
I. Theoretischer Teil	5
II. Praktischer Teil:	
A. Versuche zur Darstellung von Hydrazonen einiger Ketohydrazone.	13
1. m-Nitrobenzalphenacylhydrazon	13
a) „ und o-Tolyldiazin	13
b) „ und Methylphenylhydrazin	16
c) „ und Benzylphenylhydrazin	22
d) „ und p-Nitrophenyl-N-Methyl- hydrazin	28
2. Umlagerung des m-Nitrobenzalphenacylh-drazons	30
a) umgelagertes Keton und p-Nitrophenyl-N-Methylhydrazin	31
b) „ und Phenylhydrazin	32
c) „ und Methylphenylhydrazin	32
3. p-Nitrobenzalphenacylhydrazon	33
a) „ und Methylphenylhydrazin	33
b) Kondensation durch Schmelze	33
c) Umlagerung des p-Nitrobenzalphenacylh-drazons	34
4. p-Chlorbenzalphenacylhydrazon und Methylphenylhydrazin	34
5. o-Oxybenzalphenacylhydrazon	35
6. Benzalphenacylhydrazon	36
B. Darstellung von Hydrazonen anderer Ketone mit den gleichen Hy-	
drazinen wie unter A.	38
1. m-Nitroacetophenon	
a) „ und Methylphenylhydrazin	38
b) „ und Benzylphenylhydrazin	39
2. m-Aminoacetophenon	40
3. Acetyl-m-Aminoacetophenon-methylphenylhydrazon	40
4. m-Nitrophenacyl-p-toluidin-methylphenylhydrazon	41
5. Phenacyl-methyl-anilin	44



Theoretischer Teil.

M. Busch und Mitarbeiter berichteten im Jahre 1924¹⁾, daß es ihnen gelungen sei, erstmals isomere Hydrazone in der Phenacylaminreihe darzustellen. Frühere Versuche²⁾, das stereoisomere Auftreten primärer Hydrazone von Phenacylaminen zu beweisen, waren immer negativ verlaufen.

Wenn für die eine der dabei entstandenen Formen die normale Hydrazon-Konfiguration, die Syn-Form, angenommen wurde, nämlich:



so standen für die zweite Form noch drei Möglichkeiten zur Diskussion:



Die Formelbilder I und II würden den von *Hantzsch* und *Werner*³⁾ entwickelten Theorien entsprechen. III und IV im Sinne einer Desmotropie, waren aber ebenfalls nicht von der Hand zu weisen, da einerseits häufig schon ein Wandern des Methyleng-Wasserstoffs beobachtet worden war (III), andererseits aber Hydrazone auch durch Kupplung von Verbindungen die eine Methylengruppe enthalten, mit Diazoniumsalzen dargestellt worden sind (IV). Während bis jetzt nur eine Konfigurationsbestimmung in dem Sonderfall der Hydrazone der Dithiokohlensäureester erbracht werden konnte⁴⁾ — gelang *Busch* auf Grund


1) *Busch*, *Friedenberger*, *Tischbein*, B 57, II, 1783.

2) *Busch* und *Hefele*, J. p. Ch. 83, 425.


3) B XXIII, I, 11; *Werner*, *Lehrb. d. Stereochem.*

4) *Busch*, B 45, 73; J. p. Ch. (2) 93, 25 u. 339.

der erwähnten Versuche mit seinen Schülern, diese Beweisführung nunmehr auch für primäre Hydrazone von Phenacylaminen⁵⁾. Er fand, daß die eine Form mit Aldehyden in glatter Reaktion Wasser abspaltet und ein Triazinderivat bildet:




Die andere Form hingegen liefert mit Aldehyden keine Triazine: hier findet eine der Aldol-Kondensation ähnliche Reaktion statt:



Es war also Desmotropie entsprechend den Formeln I und II nicht möglich, denn dann hätten ja beide Formen zu Triazinderivaten kondensieren müssen. Der Fall IV trifft ebenfalls nicht zu, weil hier kein aldolähnliches Anlagerungsprodukt hätte auftreten können. Die Azoform kommt auch deswegen nicht in Betracht, weil keines der Isomeren der Hydrierung zugänglich ist; eine Azoverbindung der Formel IV aber sollte leicht Wasserstoff aufnehmen. Außerdem aber sind desmotrope Körper nicht so stabil, wie die aufgefundenen Isomeren. Es konnte sich also nur um Stereoisomerie nach I und II im Sinne der *Hantzsch-Werner'schen* Theorie handeln.


Eine starke Stütze für diesen Beweis war die Auffindung von sekundären Hydrazone der Phenacylamine im Jahre 1931⁶⁾. Keine der beiden Formen reagiert mehr mit Aldehyden, weshalb Desmotropie im Sinne der Formeln



auch hier ausscheidet, denn bei B hätte mit Aldehyden Biazolbildung erfolgen müssen im Sinne der Formel C


5) B 57, II, 1783.

6) Busch, Wesely und Külpert, B 64, II, 1589.



Es steht daher fest, daß es sich bei den zwei Formen der primären und sekundären Phenacylaminhydrazone um Stereoisomerie handelt, wobei im Fall der primären Hydrazone zwischen Syn- und Anti-Form genau unterschieden werden kann. Die Syn-Formen schmelzen höher als die Anti-Formen, und sind auch schwerer löslich als diese.

E. Wedekind wies erstmalig die Racembildung bei optisch aktiven Verbindungen des fünfwertigen Stickstoffs nach⁷⁾, ebenso fand er in einigen Fällen sogar Autoracemisation, die z. B. beim Bromid eines sogen. Aminammoniumsalzes von der Formel



besonders stark ausgeprägt ist.

Bei den Versuchen zur Darstellung sekundärer Hydrazone⁸⁾ machten nun *Busch* und Mitarbeiter die interessante Beobachtung, daß auch bei diesen Verbindungen des dreiwertigen Stickstoffs Racembildung möglich ist: außer den beiden stereoisomeren Formen kann noch eine *dritte, bimolekulare Form* auftreten, die aus je einem Molekül der Syn- und Anti-Form aufgebaut ist, also dem Racemat optisch aktiver Verbindungen entspricht. Dieses Racemat kristallisiert aus der alkoholischen Reaktionsflüssigkeit und geht aus den gebräuchlichen organischen Lösungsmitteln unverändert wieder hervor. Man kann es jedoch zerlegen, wenn man seine Chloroform-Lösung mit Alkohol versetzt und langsamem Verdunsten überläßt; der Hauptteil des Racemats wird nun in Form der monomolekularen Isomeren abgeschieden, die sich sowohl hinsichtlich der Farbe wie auch der Kristallform deutlich unterscheiden. Die spaltende Wirkung des Chloroform-Alkohol-Gemisches beruht auf der verschiedenen Löslichkeit der Isomeren. Beim Verdunsten des Chloroforms nimmt die Concentration der Lösung allmählich zu. Ist schließlich

7) B 47, 2707; 49, 942.

8) Busch, Wesely und Küspert, B 64, II, 1589.

das Löslichkeitsprodukt des schwerer löslichen Hydrazons überschritten, so kristallisiert es aus. Der selbe Vorgang führt mit fortschreitender Konzentrations-Erhöhung auch zur Abscheidung der leichter löslichen Form.


Es ist auch möglich, die bimolekulare Racemat-Form aus den Antipoden aufzubauen. Löst man gleiche Gewichtsteile der Syn- und der Anti-Form in Benzol, und gibt man dann Petroläther bis zur Trübung zu, so beginnt das Racemat sich abzuscheiden.

Über Racemate im allgemeinen, also auch über solche von optisch aktiven Verbindungen des Kohlenstoffs, ist zu sagen, daß ihr Schmelzpunkt höher oder tiefer liegen kann als die Schmelzpunkte der reinen Komponenten. Im Sonderfall der Hydrazone aber hatte das Racemat immer den höchsten Schmelzpunkt. Ausnahmen sind bis jetzt nicht bekannt geworden.

Bei allen meinen Versuchen machte ich die Wahrnehmung, daß die Bildungstendenz sekundärer Hydrazone der Phenacylamine gering ist. Wie im praktischen Teil einzeln aufgeführt, änderte ich dabei die äußeren Reaktionsbedingungen von Versuch zu Versuch, und kam, um Kondensation zu erzwingen, vom einfachen mehrstündigen Stehen der Reaktionslösung bei Zimmertemperatur, über langes Kochen unter Rückflußkühlung, Zusammenschmelzen der Komponenten bis zu zweistündigem Erhitzen unter Druck im geschlossenen Rohr. Racemat-Bildung konnte ich bei keinem der von mir angestellten Versuche beobachten. *E. Schmidt*⁹⁾ stellte fest daß Racemisierung bei den Hydrazonen der Phenacylamin-Reihe nur dann eintritt, wenn sekundäre Hydrazine zur Verwendung kommen, die verschiedene Alkyle am tertiären Stickstoffatom tragen. Ich habe deshalb nur Hydrazine letztgenannter Art zu meinen Versuchen herangezogen.


Auffallender Weise konnte ich nur in einem einzigen Falle zwei Hydrazon-Formen erhalten, nämlich bei der Kondensation des m-Nitrobenzalphenacylhydrazons mit Methylphenylhydrazin.

9) Dissertation Erlangen, 1934.




Aber gerade bei diesem Keton und auch bei seiner p-Verbindung, dem p-Nitrobenzalphenacylhydrazon, traten größere Schwierigkeiten auf, wenn sie mit Benzyl-phenyl- und m-Nitrophenyl-N-methylhydrazin condensiert werden sollen. *Busch* und *Foerß*¹⁰⁾ die das m-Ketohydrazon zum ersten Male darstellten, hatten es bis jetzt zu Kondensationen noch nicht herangezogen. Aus den vielfach variierten Versuchen mit den erwähnten Hydrazinen erhielt ich, meist in beträchtlicher Ausbeute, gelbe Produkte, die bei den verschiedensten Temperaturen, sogar auch oberhalb von 200°, unter Zersetzung schmolzen. Erfahrungsgemäß konnten es also keine Hydrazone sein, die sich beim Schmelzen nicht zersetzen und deren Schmelzpunkte selten sich 200° nähern. Ich untersuchte hierauf die Beständigkeit meiner beiden Ketohydrazone, indem ich sie in Chloroform-Alkohol-Lösung dem Einfluß von Schwefelwasserstoff unterwarf.

Schon früher (loc. cit.) machten *Busch*, *Friedenberger* und *Tischbein* die interessante Beobachtung, daß Schwefelwasserstoff die niedrigschmelzende β -Form glatt in die höher schmelzende α -Form umlagert, nachdem vorher Mineral Säuren und Essigsäure, in vorsichtiger Weise zur Einwirkung gebracht, dies nicht vermocht hatten. Ich erhielt nun ganz ähnliche Resultate. Jedoch wurden hier die höher schmelzenden Formen des m- und p-Nitrobenzalphenacylhydrazon in die niedriger schmelzenden Formen umgelagert. Vermutlich vollzieht sich der Prozeß unter vorübergehender Anlagerung des Schwefelwasserstoffs:




10) J. p. Ch. 119; vergl. ferner *Busch* u. *Külpert*, J. p. Ch. 144.



Da die umgelagerte Form nicht oder nur schwer kondensiert, dürfte ihr aus sterischen Gründen die Konfiguration III zukommen.

Durch die Umlagerung des m- und p-Nitrobenzalphenacylhydrazon werden die Verhältnisse äußerst kompliziert, die Zahl der möglichen Hydrazon-Isomeren steigt auf sechs.

Ich versuchte daher, die umgelagerten Produkte mit Hydrazinen zu kondensieren, mußte aber feststellen, daß die Reaktionen größtenteils nicht vor sich gegangen waren, trotz Verwendung von Kondensationsmitteln. Demnach sollte der wenn auch schwer mit Hydrazonen reagierenden h-Form die Anti-Konfiguration I, dem n-Isomeren die Syn-Konfiguration III zuerkannt werden. Dem Vorgang würde also folgende Gleichung gerecht werden:



denn die umgelagerte Form II (n-Form) dürfte mit Hydrazinen schwierig zu kondensieren sein infolge des Widerstandes, der dem Eintritt des Hydrazin-Restes durch die Benzal-Gruppe hier entgegengebracht wird. Durch die angedeuteten Verhältnisse wird das Problem, aufzuklären, unter welchen Bedingungen die Molekülverbindungen (Racemate) der isomeren Hydrazone auftreten, so erschwert, daß ich die Untersuchung der Doppelhydrazone des Phenacylhydrazins als wenig geeignete Versuchsobjekte abbrach.

Hinsichtlich der von *Hantzsch-Werner* postulierten 2 Hydra-

zon-Formen blieben fast alle meine Versuche erfolglos, ich erhielt immer nur eines der erwarteten Isomeren. Ich bemühte mich daher, durch Zusatz eines geeigneten Kondensationsmittels die Ausbeuten zu erhöhen, um damit möglicherweise günstigere Bedingungen für das Entstehen der anderen Form zu schaffen. Jedoch weder bei den Ketonen der Phenacylamin-Reihe, noch bei anderen wollte mir dies gelingen.

Um das bei der Kondensation entstehende Wasser aus der Reaktion zu entfernen, setzte ich dem Gemisch der Komponenten hygroskopisch wirkende Substanzen zu: Chlorcalcium und Phosphorpentoxyd. Das erstere hatte nur geringen Einfluß auf die Ausbeuten, das letztere aber wirkte reißlos zerstörend auf die empfindlichen Phenacylamine. Bei einem Blindversuch ohne Hydrazin, wurden z. B. 0,5 g m-Nitrobenzalphenacylhydrazons fast völlig zerlegt; ich fand nur 0,1 g eines kristallisierten Produktes, dessen Schmelzpunkt bedeutend höher lag als der des Ketons.

Rein katalytisch wirkende Zusätze, wie alkoholische Salzsäure und Eisessig, die bisher erfahrungsgemäß mit gutem Erfolge angewendet worden sind, zeigten wechselnde Ergebnisse. Als absolut erfolglos erwies sich die Anwendung von Bor säure.

Zuletzt wählte ich Chlorzink als Zusatz, das sowohl hygroskopische als auch saure Eigenschaften in sich vereint. Es scheint so zu wirken, daß es die Reaktion vorwiegend in Richtung des stabileren Isomeren lenkt. Bei der Kondensation des m-Nitroacetophenons mit Benzylphenylhydrazin, wo König¹¹⁾ angeblich zwei Isomere des m-Nitroacetophenon-benzylphenylhydrazons erhielt, fand ich nur die bei 85–86° schmelzende (n) Form. Was die Ausbeuten anlangt, (siehe prakt. Teil), erwies sich das Chlorzink als sehr kondensationsfördernd. Ich setzte es den Reaktionsgemischen, in Methylalkohol gelöst, zu. Da es jedoch mit den Ketonen und Hydrazonen Zinkdoppelsalze bildet, die durchweg zwischen 200 und 300° schmelzen, muß es entfernt werden, was zweckmäßigerweise dadurch erreicht wird, daß man es als Ion in Lösung hält. Die Reaktionsflüssigkeit wird nach dem Abdestillieren des Chloroforms mit Alkohol


11) Dissertation Erlangen, 1935, S. 35.

(sofern sie diesen nicht schon enthält) und Wasser versetzt und conc. Ammoniak zugefügt. Angesichts der Empfindlichkeit von Ketonen und Hydrazonen verbietet sich die Anwendung von Kali- oder Natronlauge.

Zusammenfassung.

1. Die durchweg sehr träge verlaufende Kondensation zwischen Ketonen und sekundären Hydrazinen wird durch Chlorzink katalytisch günstig beeinflusst.
2. Aus den Hydrazonen des Phenacylhydrazons

$$\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CO} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{NH} \cdot \text{N} = \text{CHR}$$
konnten zwar die Doppelhydrazone



noch erhalten werden. Die Beurteilung der Konfiguration wird hier jedoch sehr erschwert, da die Monohydrazone schon bei der Kondensation mit sekundären Hydrazinen leicht umgelagert werden



und zwar reagiert die umgelagerte Form aus leicht ersichtlichen sterischen Gründen mit Hydrazin nicht oder nur sehr schwer.

3. Ich konnte feststellen, daß die unter 2. angegebene Umlagerung in manchen Fällen auch mit Schwefelwasserstoff durchzuführen ist.
4. Aus folgenden Ketonen: p-Chlorbenzalphenacylhydrazon, m-Nitroacetophenon, Acetyl-m-aminoacetophenon und m-Nitrophenacyl-p-toluidin, habe ich die sekundären Hydrazone erhalten, aber nur in einer Form. Es konnte somit bei diesen Hydrazonen das ursprünglich gestellte Problem der Lösung nicht näher gebracht werden.


Praktischer Teil.

A. Versuche zur Darstellung von Hydrazonen einiger Ketohydrazone.


1. m-Nitrobenzalphenacylhydrazon.

a) Kondensation mit o-Tolylhydrazin.

Das o-Tolylhydrazin wurde zunächst als Komponente gewählt, da *Busch*, *Friedenberger* und *Tischbein* bei ihrer grundlegenden Untersuchung¹²⁾ über primäre Arylhydrazone günstige Ergebnisse damit erzielt hatten. So fanden sie z. B. beim o-Tolylhydrazon des N-Phenacyl-p-anisidin



n-Form in 50 % und h-Form in 50 % Ausbeute.



Das Ketohydrazon m-Nitrobenzalphenacylhydrazon erhielt ich unschwer nach den Angaben von *Busch* und *Först*¹³⁾ aus der alkoholischen, schwach eßigsauren Lösung der beiden Komponenten Phenacylhydrazin¹⁴⁾ und m-Nitrobenzaldehyd.

Bei Darstellung des Phenacylhydrazins ist es, um die Ausbeute zu erhöhen, unbedingt notwendig, das Phenacylbromid in absolutem Alkohol zu lösen. Aus demselben Grunde ist es

12) B 57, II, 1786.

13) J. p. Ch. 119, S. 295.

14) Busch und Külpert, J. p. Ch. 144, S. 278; Busch und Först, 119, S. 290.

angebracht, die (loc. cit.) angewandten Mengen (24 g) nicht in einem, sondern in zwei Ansätzen mit Hydrazinhydrat in Reaktion zu bringen. Aus 24 g Phenacylbromid erhielt ich mit gewöhnlichem Alkohol 8 g Phenacylhydrazin, mit absolutem jedoch 12 g Phenacylhydrazin, 1 g mehr als Först (loc. cit.), was eine Erhöhung der Ausbeute von 60% auf 66% bedeutet.

α. Anwendung der Hydrazinbase.

Eine ganze Reihe von Versuchen zeigte mir die Nutzlosigkeit der Verwendung der Base selbst. Als einziges kristallisiertes Produkt erhielt ich nur unverändertes Keton zurück.

β. Anwendung des salzsauren Hydrazins.

Die Lösung von 0,6 g m-Nitrobenzalphenacylhydrazon in möglichst wenig Methylalkohol wird mit der gleichen Lösung von 0,4 g o-Tolylhydrazin-hydrochlorid (d. i. ca. 10% Überschuß) umgesetzt und längere Zeit sich selbst überlassen. Nach etwa 4 stündigem Stehen hatte sich die Reaktionsflüssigkeit weinrot gefärbt, und nach 2—3 Tagen waren 0,2 g eines ebenso gefärbten Produktes in drüsig-kristallinen Nadeln ausgefallen. Nach wiederholtem Umkristallisieren aus Methylalkohol lag der Schmp. bei 161°; Farbe hellrot. Ausbeute ca. 20% der Theorie.

Auch durch Erhöhung des Hydrazin-Überschusses von 10% auf 40% konnte ich keine bessere Ausbeute erhalten, trotzdem ich das Reaktionsgemisch 4 Stunden auf der Schüttelmaschine hatte. Bei diesem Versuch erhielt ich, nachdem ich das Doppelhydrazon durch öfteres Dekantieren mit heißem Methylalkohol in Lösung gebracht hatte, einen Rückstand von orangeroter Farbe, Schmp. 244°. Seiner äußerst geringen Menge wegen habe ich das Produkt nicht näher untersucht.

Ein weiterer Versuch, bei dem ich 5 g des Ketons in Chloroform löste, darauf die concentrierte methylalkoholische Lösung von 3,7 g o-Tolylhydrazin-hydrochlorid (d. i. 35% Überschuß) hinzufügte und über Nacht im Dunkeln stehen ließ, zeigte bezüglich der Ausbeute einen etwas besseren Erfolg. Ich erhielt hier 2,5 g des bei 161° C schmelzenden Doppelhydrazons, also ca. 30% der Theorie.

Stickstoffbestimmung:

1,375 mg Sbft.: 0,229 ccm N (21,5°, 729 mm)

$C_{22}H_{21}O_2N_5$ ber.: 18,1% N gef.: 18,6% N.

Bei keinem der Versuche jedoch gelang es mir, ein Isomeres dieses Hydrazons zu erhalten. Nun versuchte ich, nach der Methode von *Emil Fischer*, durch Zusammenschmelzen beider Komponenten, zum Ziel zu kommen.

γ. Zusammenschmelzen der Komponenten.

1 g m-Nitrobenzalphenacylhydrazon und 0,5 g o-Tolylhydrazin-hydrochlorid (10% Überschuß) wurden fein pulverisiert und gemischt. Diese Mischung wurde in einem Reagenzglas im Schwefelsäurebad erhitzt. Bei 100° etwa begann sie zu schmelzen unter gleichzeitiger starker Gasentwicklung. Durch den Geruch sowie durch die Salmiakprobe konnte ich feststellen, daß Ammoniak entstanden war. In diesem Zusammenhang sei auf eine frühere Untersuchung von *Busch*¹⁵⁾ hingewiesen. Dieser Forscher fand, daß primäre Arylhydrazine mit ihren salzsauren Salzen bei höheren Temperaturen weitgehender Zersetzung unterliegen, in deren Verlauf neben dem Amin auch Stickstoff, Ammonchlorid, und, bei 175°, auch noch Benzol entstehen. Die im oberen, kühlen Teil des Glases kondensierten Wassertröpfchen entfernte ich mit Filtrierpapier. Nach dem Erkalten nahm ich die dunkelrote Schmelze in Chloroform auf und versetzte dann mit dem gleichen Volumen Aethylalkohol. Nachdem ich nun das Chloroform und auch den größten Teil des Alkohols im Vakuum abdestilliert hatte, war ein dunkles Öl entstanden, in dem einige wenige Kristalle zu erkennen waren. Nach vorsichtigem Digerieren mit wenig Äther und nachdem ich das Kölbchen einige Zeit verschlossen hatte stehen lassen, war aus dem Öl ein rotbraun gefärbtes Kristallisat abgeschieden worden, das ungefähr bei 153° schmolz. Durch Sieden mit wenig Alkohol erzielte ich unschwer eine Trennung in ein gelb-braunes, in Alkohol leicht lösliches und in ein rotes, schwer lösliches Produkt. Nach dem Abgießen vom schwer löslichen Rückstand kommt im Filtrat sehr schnell der gelbe Körper zur Abscheidung. Er ist bereits jetzt ganz rein, schmilzt bei 152° und erstarrt bei 150° wieder. Der Rückstand

15) J. p. Ch. 116, 39.

war äußerst gering und bestand aus ungelösten gelben Kry stallen, welche bei 153° schmolzen und deshalb wohl dem Produkt 152° mit zuzurechnen sind.

Aus dem in den letzten Reaktionsmutterlaugen befindlichen Ölen erhielt ich, nachdem ich mit Äther längere Zeit verschlossen hatte stehen lassen, ein zweites Kry stallisat, das ich nach dem Absaugen mit wenig gekühltem Äther wusch. Die derben, prächtig glänzenden, rubinroten Nadeln kry stallisierte ich aus Alkohol um und fand ihren Schmp. bei 168°. Der Körper ist leicht löslich in Chloroform, löslich in Benzol, schwer löslich in Alkohol, Äther, Ligroin und Petroläther.

Leider mußte ich feststellen, daß beide Produkte nicht die erwarteten isomeren Formen des m-Nitrobenzalphenacylhydrazon-o-Tolylhydrazons waren.

Stickstoffbestimmung:

Prod. Schmp. 152°

4,156 mg Sbft.: 0,617 ccm N (22°, 738 mm)

C₂₂H₂₁O₂N₅ ber.: 18,08% N; gef.: 16,68% N

Prod. Schmp. 168°



2,968 mg Sbft.: 0,523 ccm N (21°, 732 mm)

C₂₂H₂₁O₂N₅ ber.: 18,08% N; gef.: 19,1% N

b) Kondensation von m-Nitrobenzalphenacylhydrazon mit Methylphenylhydrazin.

α. Die Komponenten reagieren in Lösung.

Nachdem die erste Probe ergeben, daß das Methylphenylhydrazin zu den gesuchten 2 Isomeren des Doppelhydrazons,



habe ich im Interesse der weiteren Arbeiten eine längere Reihe von Versuchen angestellt, um die günstigsten Bedingungen für

die Kondensation von Phenacylhydrazonen mit sekundären Hydrazinen aufzufinden.

Zu der Lösung von 1,5 g des Ketons in Chloroform werden bei Zimmertemperatur 1,5 g Methylphenylhydrazin (100% Überschuß) gegeben. Eine geringe Menge wieder ausgefallenen Ketons löste ich durch Erwärmen wieder und ließ das Kölbchen ein paar Tage geneigt liegen. Als die Hälfte des Chloroforms abgelaufen war, setzte ich das gleiche Volumen Methylalkohol zu. Nach kurzer Zeit war ein dunkelrosa gefärbter Niederschlag erschienen; ich saugte ihn ab und versetzte das Filtrat vorsichtig mit Wasser. Auf diese Weise erhielt ich insgesamt 4 Fraktionen:

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1. Fraktion | sintert bei | 99°, Schmp. | 103—105° |
| 2. " | " | " | 105°, " 108—109° |
| 3. " | " | " | 98°, " 100—101° |
| 4. " | " | " | 133°, " 139° |

Fraktionen 1—3 hatten dunkelrosa Färbung, Fraktion 4 war gelblich. Die Niederschläge sind löslich in Benzol, leicht löslich in Chloroform, etwas schwerer löslich in Methyl- und Äthylalkohol.

Nach dem UmkrySTALLISIEREN aus Chloroform-Methylalkohol hatten die Fraktionen 1—3 Schmelzpunkte zwischen 108 und 109°. Ich vereinigte sie daher, krySTALLISIERTE nochmals um, und fand nun den Schmp. 109°. Feine, versilzte Nadelchen.

Nach UmkrySTALLISIEREN aus Alkohol war der Schmp. 151°. Die derben, gelbbraunlich bis schwach violett gefärbten Tafeln und Würfel zeigten prächtige Lichtbrechung.

Aus den letzten Mutterlaugen konnte ich dann noch eine kleine Menge eines Gemisches beider Formen erhalten. Da die n-Form (Schmp. 109°) in Alkohol leichter löslich ist als die h-Form (Schmp. 151°), hatte ich, nach öfterem, vorsichtigem Dekantieren mit wenig warmem Alkohol, die letztere schon ziemlich rein als Rückstand vorliegen.

Stickstoffbestimmung:

h-Form Schmp. 151°

5,371 mg Sbft.: 0,873 ccm N (20°, 737 mm)

C₂₂H₂₁O₂N₅ ber.: N = 18,09 % gef.: N = 18,28 %

n-Form Schmp. 109°

3,155 mg Sbft.: 0,520 ccm N (23°, 735 mm)

$C_{22}H_{21}O_2N_5$ ber.: N = 18,09 gef.: N = 18,38.

Die h-Form ist in Chloroform spielend leicht löslich, schwerer in Alkohol; die n-Form ist in Alkohol ebenso leicht löslich als in Chloroform. Beim Trennen beider Formen ist darauf zu achten, daß nicht zuviel Alkohol auf einmal angewendet wird, und daß auch nicht bis zum Sieden erhitzt werden darf, da der Löslichkeitsunterschied zwischen beiden Formen nur gering ist.

Molekulargewichtsbestimmung des Produkts vom Schmp. 151°:

27,174 mg Sbft. gaben in Benzol eine Depression von 0,056°.

M = 386 gef. 366.

β. Kondensation in Lösung unter Verwendung von Kondensationsmitteln.

Versuch unter Zusatz von Eisessig.

Aus 2 g m-Nitrobenzalphenacylhydrazon wird eine kalt gesättigte Chloroform-Lösung hergestellt und 2 g Methylphenylhydrazin (d. i. 100 % Überschuß), sowie 1 Tropfen Eisessig hinzugefügt. Die Lösung blieb nun zwei Tage verschlossen im Dunkeln stehen. Die schöne weinrote Farbe zeigte an, daß Reaktion erfolgt war. Nach Ablauf der Hälfte des Chloroforms gab ich das gleiche Volumen Alkohol zu und erhielt als erste Fraktion fast 50 % (0,9 g) unverändertes Keton zurück. Weiterhin erhielt ich 0,7 g von der n-Form und 0,2 g von der h-Form des Hydrazons.

Gesamtausbeute an Hydrazon: 0,9 g, d. h. 25 % der Theorie. Die n-Form war in der 3 fachen Menge angefallen, als die h-Form.

Versuch unter Zusatz von alkoholischer Salzsäure.

Zu der kalt gesättigten Chloroformlösung von 1 g des Ketons werden 1 g Methylphenylhydrazin (100 % Überschuß) und 1 Tropfen einer 12 % igen alkoholischen Salzsäure gefügt. Von einem kleinen Rest wieder ausgefallenen Ketons saugte ich nach 36 stündigem Stehen wieder ab und behandelte die Reaktionslösung wie üblich weiter.

Ich erhielt 0,45 g unverändertes Keton, wiederum also nahezu

die Hälfte, zurück, und daneben 0,4 g der n-Form und 0,25 g der h-Form. Die Gesamtausbeute an Hydrazon war also 0.65 g d. h. etwa 32 % der Theorie. Hiervon wieder betrug die Ausbeute an n-Form ca. 24%, diejenige an h-Form ca. 8%.

Resultat: Bei Anwendung alkoholischer Salzsäure ist die Ausbeute an Hydrazon besser (32 % der Theorie) als bei Anwendung von Eisessig (25% der Theorie). Auch die h-Form wird hier in etwa der doppelten Ausbeute erhalten. Aus den Ölen der letzten Reaktionsmutterlaugen waren keine Krysfallate mehr zur Abscheidung zu bringen.

Ein anderer Versuch, bei dem 2 g m-Nitrobenzalphenacylhydrazon und 2 g Methylphenylhydrazin angewandt wurden, jedoch ohne Zusatz eines Kondensationsmittels, lieferte nach nur 16 stündigem Stehen wieder 1,8 g, d. h. 90% des Ketons unverbraucht zurück.

An Hand zahlreicher weiterer Versuche, die auch hinsichtlich der zur Reaktion gelangenden Hydrazin-Mengen variierten, stellte ich fest, daß auch mehrstündiges (bis zu 8 und 9 Std.) Kochen der Reaktionslösung auf dem Wasserbad keine Verbesserung der Ausbeuten brachte, gleichgültig, ob die Komponenten nun in Chloroform, Alkohol oder in einer, wie immer auch zusammengesetzten Mischung beider Solventien gelöst waren. Im Gegenteil, das m-Nitrobenzalphenacylhydrazon scheint bei längerem Erhitzen der Zersetzung anheimzufallen. Ich fand nämlich bei all diesen Versuchen neben wechselnden Mengen des zitronengelben Ketons, auch andere Produkte von der gleichen zitronengelben Farbe, die jedoch nicht wie dieses, bei 147° unter Zersetzung, sondern bei allen möglichen anderen Temperaturen zwischen 125° und 140° schmolzen und zwar ebenfalls unter Zersetzungsercheinungen. *Busch* und *Först*¹⁶⁾ die das Keton erstmals darstellten, erhielten es in reiner Form aus Alkohol. Ich versuchte nun, diese Zersetzungsprodukte zu reinigen, in der Annahme, es mit verunreinigtem Keton zu tun zu haben. Wohl stiegen die Schmelzpunkte an, jedoch keines dieser Produkte konnte ich als Keton identifizieren, denn sie schmolzen alle bereits unterhalb von 147°, trotzdem ich sie sehr oft aus Alkohol und auch aus Chloroform-Alkohol und Benzol umkrysfallisiert

16) J. p. Ch. 119, 290.

hatte. Nachdem ich dies festgestellt hatte, war mir klar, daß auch durch noch so langes Erhitzen der Reaktionslösung eine Erhöhung der Ausbeute nicht zu erreichen war.

Allgemein aber ist zu sagen, je größer der Überschuß an Hydrazin ist, desto besser werden die Ausbeuten; in der gleichen Richtung wirkt auch eine Verlängerung der Reaktionsdauer.

γ. Kondensation unter Druck.

1 g Keton wird heiß in Chloroform gelöst, mit 1 g Methylphenylhydrazin versetzt und zwei gehäufte Spatel Chlorcalcium hinzugefügt. Die Lösung wird nun im geschlossenen Rohr 6 1/2 Std. lang auf 100° erhitzt.

Nach dem Erkalten und Abgießen der roten Reaktionslösung vom Rückstand des Chlorcalciums erhielt ich

0,27 g n-Form Schmp. 109°

und 0,05 g h-Form Schmp. 151°

zusammen also 0,32 g Hydrazon, d. h. 16% der Theorie.

Die letzten Mutterlaugen der Reaktionslösung waren stark verharzt und ölig und konnten nicht zur KrySTALLISATION gebracht werden.

Resultat: Im Vergleich zum vorhergehenden Versuch war hier also die Gesamtausbeute um fast 10% gesunken und betrug nur mehr 16% der Theorie. Das nicht in Reaktion getretene restliche Keton konnte ich nicht auffinden; es war unter der Einwirkung von Druck und Temperatur völlig zerlegt worden.

δ. Kondensation unter Verwendung von Chlorzink.

Nachdem die vorausgehenden Versuche, die Kondensation des m-Nitrobenzalphenacylhydrazons mit Methylphenylhydrazin durch Zusatz der gebräuchlichen Kondensationsmittel ergiebiger zu gestalten, keinen befriedigenden Erfolg gezeigt hatten, untersuchte ich auf Anregung meines hochverehrten Lehrers, welchen Einfluß Chlorzink auf den Reaktionsvorgang hat. Hierzu löste ich das Chlorzink erst in Methylalkohol und setzte es dann in dieser Form der Reaktionslösung zu. Um gleichzeitig die Wirkung besser beobachten zu können, setzte ich folgenden Versuch an.

Die Mischung von 1,5 g Keton in Chloroform und 1,5 g Methylphenylhydrazin (100% Überschuß) teilte ich in drei gleiche

Teile a, b, c, und gab nun, jeweils 2 g, zu der Lösung b Chlorcalcium, zu der Lösung c Chlorzink, während a keinerlei Zusatz erhielt. Der Versuch zeitigte nach ca. 24 stündigem Stehen bei Zimmertemp. und nachdem die Reaktionslösungen in bekannter Weise verarbeitet waren, folgende Resultate:

	a	b mit Ca Cl ₂	c mit Zn Cl ₂
Produkt:	0,5 g Keton	0,5 g Keton	0,5 g Keton
	Schmp. 139 ⁰ z.	n-Form (109 ⁰)	n-Form (111 ⁰)
	0,4 g	0,12 g	0,36 g
		h-Form (151 ⁰)	h-Form (151 ⁰)
		sehr wenig	0,15 g
	Rest: Oel	Rest: Oel	Rest: Oel

Hieraus geht klar hervor, daß Zn Cl₂ einen günstigen Einfluß auf die Kondensation ausübt. Es wurden 0,36 g (53% der Theorie) an n-Form, 0,15 g (22%) an h-Form, zusammen also eine Hydrazon-Ausbeute von 0,5 g (75%) erhalten. Alkoholische Salzsäure liefert 32%, Eisessig 25%, Chlorcalcium unter Druck 19% der Theorie.

ε. Zusammen-schmelzen der Komponenten.

1 g feinst pulverisierten m-Nitrobenzalphenacylhydrazons übergieß ich im Reagenzglas mit der Lösung von 1 g Methylphenylhydrazins in Petroläther, um so möglichst gute Durchmischung beider Komponenten zu erzielen, und erhitzte nach dem Verdunsten des Petroläthers im Schwefelsäurebad. Bei 135⁰ schmolz das Gemisch unter Entwicklung von Ammoniak. Das im oberen Teil des Rohres kondensierte Wasser entfernte ich mit Filtrierpapier. Nach dem Erkalten nahm ich die dunkle Schmelze in wenig heißem Chloroform auf, versetzte mit dem 1—1½fachen Volumen Alkohol und ließ über Nacht geseigt stehen. Ich erhielt dann als 1. Fraktion 0,35 g der n-Form, während die h-Form nur in äußerst geringer Menge entstanden war. Aus der öligen Reaktionsmutterlauge konnte ich, trotz Digerierens mit Äther, auch bei längerem Stehen kein krySTALLisiertes Produkt mehr erhalten.

Resultat: Die Ausbeute an n-Form war 17,5% der Theorie,

während die an h-Form überhaupt keine nennenswerte Rolle spielte.


Da ich kein weiteres Produkt mehr finden konnte, nahm ich an, daß die Körper vom Schmp. 109⁰ und 151⁰ tatsächlich die beiden isomeren Formen des m-Nitrobenzalphenacylhydrazon Methylphenylhydrazons waren. Ich versuchte nun, durch Synthese das Racemat zu erhalten. Je 10 mg n- und h-Form wurden in der Achat[s]chale feinst pulverisiert und gut gemischt. Das Gemisch beider Formen wurde nun im Schwefelsäurebad zusammengesmolzen. Hierbei fand ich folgende Daten:

 sintern bei 101⁰ C klare Schmelze bei 124⁰ C (hellrot).
Bei langsamen Abkühlen erstarrt die Schmelze wieder, um nunmehr bei nochmaligem Erhitzen bei 97⁰ klar zu werden.

Durch Zusammenschmelzen ist also die Racematbildung nicht erreicht worden. Der Schmp. 97⁰ liegt unterhalb der Schmelzpunkte beider Formen; er bildet den eutektischen Punkt und zeigt ein reines Gemenge beider Formen an. Wäre ein Racemat entstanden, so müßte dessen Schmelzpunkt auf jeden Fall oberhalb von 151⁰ liegen.

Es blieb nunmehr noch die Möglichkeit, daß die Form Schmp. 151⁰ das fragliche Racemat war. In diesem Falle mußte es in seine beiden Antipoden gespalten werden können. Ich löste daher 0,1 g dieses Körpers in 2 ccm Chloroform, fügte die gleiche Menge Alkohols hinzu, und ließ das Kölbchen über Nacht aufrecht stehen. Am Morgen waren die bräunlich-gelben, schwach violett schimmernden Tafeln vom Schmp. 151⁰ unverändert wieder auskrySTALLISIERT.

c) Kondensation von m-Nitrobenzalphenacylhydrazon mit Benzylphenylhydrazin.



a. Versuche zur Kondensation in Lösung.

1. 1,5 g m-Nitrobenzalphenacylhydrazon in Chloroform gelöst werden mit 1 g Benzylphenylhydrazin versetzt und 3 Std. lang auf dem Wasserbad zum Sieden erhitzt. Insgesamt fielen 95% des Ketons wieder an. Die Kondensation war also unter diesen Bedingungen kaum vor sich gegangen. Das Oel der letzten Mutterlaugen lieferte auf Behandeln mit Äther eine äußerst geringe Menge eines hellgelben kristallinen Niederschlages vom Schmp. 152°, der aber nicht weiter untersucht werden konnte. Ein weiterer Versuch, bei welchem ich einen Hydrazin-Überschuß von 300% anwandte und ebenfalls 3 Std. erhitzte, hatte den gleichen Mißerfolg: ich erhielt fast das gesamte Keton unverändert wieder zurück.

2. 4 g m-Nitrobenzalphenacylhydrazon werden in möglichst wenig Chloroform gelöst, 3 g Benzylphenylhydrazin (10%) und 1 Tropfen Eisessig hinzugefügt, und diese Lösung wird nun 10 Std. auf dem Wasserbad erhitzt. Die Rotfärbung zeigte an, daß eine Reaktion eingetreten war. Ich ließ das Kölbchen über Nacht geneigt stehen, saugte am anderen Morgen von wieder ausgefallenem Keton (ca. 10—15%) ab, versetzte mit dem gleichen Volumen Alkohol und entfernte das Chloroform im Vakuum, wobei ich die Lösung auf 60—70° erwärmte.

Bei weiterem Einengen der Lösung scheidet sich ein dunkles Oel ab. Durch Verreiben mit wenig Äther konnte ich drei Produkte von gelblicher Farbe erhalten, deren Schmelzpunkte 117—118°, 125—126° und 123—124° erkennen ließen, daß es sich um dasselbe Produkt handelte; es waren insgesamt ca. 0,4 g Substanz. Durch Lösen in heißem Methylalkohol erhielt ich zwei Fraktionen:

- 1) schwer löslicher Anteil, 0,3 g orangefarbene Nadelchen
Schmp. 140—141° ohne Zersetzung.
- 2) leichter löslicher Anteil, knapp 0,09 g gelbe Nadelchen,
Schmp. 135—136° ohne Zersetzung.

Stickstoffbestimmung:

Körper Schmp. 140°, 4,617 mg Sbft.: 0,249 ccm N (26°, 741 mm)

$C_{28}H_{25}O_2N_5$ ber.: 15,118% N; gef.: 6,16% N

Körper Schmp. 135/6°, 2,76 mg Sbft.: 0,405 ccm N (26°, 741 mm)

$C_{28}H_{25}O_2N_5$ ber.: 15,118% N; gef. 16,30% N

Resultat: Die Analysen zeigen, daß die Kondensation nicht zu dem erwarteten Hydrazon geführt hatte. Da ich aus dem entstandenen Oel kein kristallisiertes Produkt mehr erhalten konnte, mußte ich annehmen, daß das Keton, 10 Std. lang einer Temperatur von ca. 60—70° (Siedetemp. des Chloroforms) ausgesetzt, weitgehend zerfallen war, bezw. in anderem Sinn als erwartet, reagiert hatte, da ich ja nur ca. 15 % unverändert wieder zurückerhielt.

β. Versuche, unter Einwirkung von P_2O_5 Kondensation zu erzielen bei höheren Temperaturen.

Um das bei der Reaktion im Sinne einer Hydrazon-Bildung entstandene Wasser, welches zweifellos den Kondensationsvorgang ungünstig beeinflusst, aus dem Reaktionsgleichgewicht zu entfernen und unschädlich zu machen, setzte ich nun den Lösungen immer eine kleine Menge Phosphorpentoxyd zu. Augenblicklich ging die Farbe dann in ein ganz tiefes Rot über. Das zum Lösen des Ketons und des Hydrazins verwendete Chloroform hatte ich mit Phosphorpentoxyd vorgetrocknet. Ich setzte zwei Versuche an:

3,5 g m-Nitrobenzalphenacylhydrazon, gelöst in Chloroform
3,0 g Benzylphenylhydrazin (20 % Überschuß)
1,2 g Phosphorpentoxyd

1 Stunde auf dem Wasserbad erhitzt; und


2,3 g m-Nitrobenzalphenacylhydrazin, gelöst in Chloroform
2,0 g Benzylphenylhydrazin (20 % Überschuß)
0,8 g Phosphorpentoxyd

2 Std. im Bombenroht auf 90—100° erhitzt.

Die Weiterverarbeitung der Reaktionslösungen war genau die gleiche wie bei dem vorhergehenden Versuch. Ich erhielt in beiden Fällen Körper von bräunlicher bis hellgelber Färbung in den verschiedensten Kristallformen, deren Schmelzpunkte zwischen 127° und 240° lagen. Die Analysen jedoch zeigten, daß keiner dieser Körper das erwartete Hydrazon war.

Im ersten Versuch hatte ich 20 %, im zweiten 25 % eines in hellgelben breiten Nadelchen und Splintern aus Alkohol kristallisierenden Produkts vom Schmp. 139° erhalten. Ein Mischschmelzpunkt, der keine Depression ergab, identifizierte zunächst

beide Körper als die gleiche Verbindung. Die Analyse ergab, daß das m-Nitrobenzal-benzylphenylhydrazon entstanden war.



Stickstoffbestimmung:

4,056 mg Sbft., 0,46 ccm N (736 mm, 20° C)

C₂₀H₁₇O₂N₃ ber.: 12,68% N; gef.: 12,84% N.

m-Nitrobenzal-benzyl-phenylhydrazon ist in der Literatur bereits längere Zeit bekannt, kristallisiert in gelben Nadeln, ist schwer löslich in Alkohol, Äther und Ligroin, leicht in warmem Eisessig, sehr leicht in Chloroform. Nach *Minunni*¹⁶⁾ schmilzt es bei 140° und entsteht durch Eintragen von m-Nitrobenzaldehyd in eine alkoholische Lösung von N-Phenyl-N-benzylhydrazin. *Ott*¹⁷⁾ dagegen erhält das Produkt durch Einwirkung von m-Nitrobenzal-anilin auf N-Phenyl-N-benzyl-hydrazin. Dieser Autor fand gleichfalls den Schm. 140°.

Aus diesem Grunde glaube ich, von einer ausführlicheren Beschreibung Abstand nehmen zu dürfen.

Bei keinem dieser beiden Versuche konnte Keton zurückgewonnen werden.

Diese Tatsache gab mir Veranlassung, zunächst einmal die Einwirkung des Phosphorpentoxyds auf das Keton allein zu untersuchen.

Versuch: 0,5 g m-Nitrobenzalphenacylhydrazon, gelöst in Chloroform, versetzte ich mit einer Messerspitze Pentoxyds und erhitzte 6 Std. auf dem Wasserbad. Bei gleicher Arbeitsweise wie bei den vorhergehenden Versuchen, erhielt ich 0,1 g eines kryst. gelben Produkts vom Schmp. 177—178°. Die öligen Rückstände widerstanden allen Bemühungen sie zur Kristallisation zu bringen.

Resultat: Offenbar ist also das Phosphorpentoxyd bei der Siedetemperatur des Chloroforms mit dem m-Nitrobenzalphenacylhydrazon in Reaktion getreten und hat es restlos zerstört. Da das Keton unter Zersetzung bei 147° schmilzt, so kann das

16) G. 27, II, 237, 238.

17) M. 26, 339.

angefallene gelbe Produkt keinesfalls mit ihm identisch sein. Da fernerhin das Keton in Alkohol schwer löslich ist, so hätte es — wenn noch unverändert vorhanden — aus der schließlich rein alkoholischen Lösung ausfallen müssen.

γ. Versuche, bei Zimmertemperatur Kondensation zu erzielen.

Nachdem bis jetzt alle Versuche, unter der Einwirkung höherer Temperaturen zum Ziele zu kommen, gescheitert waren, versuchte ich es jetzt, die Komponenten in der Kälte in Reaktion zu bringen.

Versuch: Ich machte zwei Ansätze: 1 g des m-Nitrobenzalphenacylhydrazons des Ketons in Chloroform und 0,8 g des Benzylphenyl-hydrazins (10% Überschuß), einmal mit 1 Tropfen Eisessig und einmal ohne Eisessig, ließ ich ca. 8 Std. bei Zimmertemperatur stehen und legte die Kölbchen dann geneigt, damit über Nacht ein Teil des Chloroforms ablaufen könne. Am andern Morgen verarbeitete ich dann beide Ansätze in bekannter Weise.

Resultat: Ich hatte auch bei diesen Versuchen keinen Erfolg. Im einen Fall (mit Eisessig) erhielt ich 68% Keton unverändert zurück, im andern Fall (ohne Eisessig) 60% Keton. In keinem der beiden Fälle konnte ich aus den öligen Reaktionsrückständen krySTALLisierte Produkte erhalten.

Somit waren alle Bemühungen, unter Verwendung der Hydrazinbase selbst, Kondensation zu erzwingen, gescheitert. Ich machte nun noch einen letzten Versuch, und zwar mit dem salzsauren Benzyl-phenylhydrazin.

Versuch: Die Mischung von 0,95 g salzsauren Benzylphenylhydrazins in möglichst wenig Chloroform-Alkohol, und 0,85 g m-Nitrobenzalphenacylhydrazons in möglichst wenig Chloroform, wird 16 Std. stehen lassen. Nach dieser Zeit war die vorher noch schön gelbe Lösung dunkelrot geworden. Weitere Behandlung erfolgte wie bekannt.

Fraktion I, schön zitronengelbes Produkt (0,5 g) vom Schmelzpunkt 137°; spielend leicht löslich in Benzol, leicht löslich in heißem Alkohol, löslich in Alkohol. Aus Alkohol umkrySTALLisiert, Schmp. 138—139°.

Fraktion II 0,05 g, gehört größtenteils zu I

Fraktion III wird durch Behandlung des öligen Reaktionsrückstands mit wenig Äther und einigen Tropfen Alkohols gewonnen, jedoch ist die Ausbeute denkbar gering. Schmp. 138—147°.

Fraktion IV erhielt ich, indem ich die letzten Oelreste, die sich an den Wänden des Gefäßes abgesetzt hatten, mit wenig Alkohol in Lösung brachte, und mit Äther versetzte. Nachdem dieser sich verflüchtigt hatte, goß ich von einer sehr geringen Menge der Fraktion III ab, versetzte dies Filtrat wiederum mit wenig Äther und schüttelte mit einer kleinen Messerspitze voll Tierkohle, filtrierte ab und ließ den Äther ablaufen. Die Menge des dadurch gewonnenen, schwach bräunlich gefärbten Produktes war wieder äußerst gering und schmolz zwischen 96° und 100°.


Lediglich die Fraktion I war in einer zur Analyse genügenden Menge vorhanden.

Stickstoffbestimmung Körper Schmp. 138—139°:

0,585 mg Sbft. 0,652 ccm N (21°, 737 mm)

C₂₈H₂₅O₂N₅ ber.: 15,11% N, gef.: 12,55% N.

Wie in einigen vorhergehenden Versuchen schon gefunden, war auch bei diesem das m-Nitrobenzal-benzylphenylhydrazon

entstanden,  , dessen N-Gehalt

12,68% beträgt. Dies wird durch obige Analyse bestätigt.

Resultat: Wie die Analyse zeigt, war also auch bei Verwendung des sauren Salzes als Hydrazin-Komponente keine Kondensation im Sinne der Theorie erfolgt.

Versuch zur Kondensation unter Anwendung von Chlorzink.

1,0 g m-Nitrobenzal-phenacyl-hydrazon, gelöst in Chloroform

0,8 g Benzyl-phenyl-hydrazin (10% Überschuß)

0,25 g Chlorzink, gelöst in Methylalkohol.

Beim Erkalten ausfallendes Keton brachte ich durch schwaches Erwärmen wieder in Lösung. Nach Zugabe des Chlorzinks färbte sich die Reaktionsflüssigkeit rotgelb. Nach ca. 4 Std. filtrierte ich von einer geringen Menge auskrySTALLISIERTEN Chlor-

zinks ab, versetzte mit dem gleichen Volumen Alkohols und ließ über Nacht geneigt stehen.

Fraktion I, 0,2 g eines gelben, zinkfreien Produkts, das nach öfterem Umkrystallisieren aus Alkohol-Chloroform und Alkohol schließlich konstant bei 139° schmolz.

Ich versetzte die Reaktionsflüssigkeit mit Wasser und conc. Ammoniak, und erhielt nach einiger Zeit

Fraktion II, 0,05 g eines derben gelben Kristallfats, das sich identisch erwies mit Fraktion I.

Weitere Produkte konnte ich aus der öligen Reaktionsflüssigkeit nicht mehr erhalten. Die Analyse ergab, daß wiederum das m-Nitrobenzal-benzylphenylhydrazon $C_{20}H_{17}O_2N_3$ in ca. 14% Ausbeute entstanden war.

Stickstoffbestimmung:

3,629 mg Sbft.: 1,417 ccm N (25° , 731 mm)

$C_{20}H_{17}O_2N_3$ ber.: 12,68% N gef.: 12,66% N.

d) m-Nitrobenzalphenacylhydrazon + p-Nitrophenyl-N-Methylhydrazin.

Das Hydrazin¹⁸⁾ hatte *Bredt*¹⁹⁾ mit gutem Erfolg angewandt und die Bildung von isomeren Formen der entsprechenden Hydrazone festgestellt. Es bestand also alle Aussicht, daß dieses Hydrazin auch mit dem von mir verwendeten m-Nitrobenzalphenacylhydrazon gute Ergebnisse liefern würde.

Die Darstellung des p-Nitrophenyl-N-methyl-hydrazins selbst ging ohne Schwierigkeiten vor sich¹⁹⁾.

Versuch: 0,6 g des Ketons werden in möglichst wenig Chloroform heiß gelöst, die Lösung von 0,4 g N-Methyl-p-Nitrophenyl-hydrazins (10% Überschuß) in Chloroform zugefügt und 6—7 Std. auf dem Wasserbad zum Sieden erhitzt. Nun wird die Hälfte des Chloroforms im Vakuum entfernt, mit der $1\frac{1}{2}$ fachen Menge Alkohols versetzt, und das restliche Chloroform noch abgedampft.

Fraktion I; 0,25 g Schmp. 129° unter Zersetzung, feine gelbe Nadelchen.

II; 0,05 g Schmp. 122° unter Zersetzung, gelbe Blätter.

18) Ciusa u. Rastelli, *Gaz. chimica ital.* **52**, II, 127.

19) Bredt, *Diff.* Erlangen 1937.

19) Bredt, S. 24.

III; 0,2 g Schmp. 126° unter Zersetzung, orangefarbene starke Spieße und Nadeln, dabei hellgelbes Kristallpulver.

IV; Schmp. 145° sehr wenig, gelb, kristallin.

V; ebenfalls wenig, Schmp. $115-120^{\circ}$ unter Zersetzung waren durch fraktionierte Trennung mit Alkohol, bezw. Benzol, noch zwei Körper gewonnen worden, die nach dem Reinigen mit einem dieser Solventien die Schmelzpunkte 118° und $162,5^{\circ}$ aufwiesen.

Körper vom Schmp. 118° bildet feine, hellgelbe Nadeln, während der Körper vom Schmp. $162,5^{\circ}$ mehr in bräunlich-gelben breiten Splintern kristallisiert.

Ich analysierte die drei Produkte und mußte feststellen, daß leider keines davon ein Hydrazon war.

Stickstoffbestimmungen:

Körper Schmp. 118°

3,204 mg Sbst.: 0,389 ccm N (23° , 742 mm)

$C_{22}H_{20}O_4N_6$ ber.: 19,44% N gef.: 13,67% N

Körper Schmp. 129° (Zersetzung)

2,956 mg Sbst.: 0,377 ccm N (24° , 742 mm)

$C_{22}H_{20}O_4N_6$ ber.: 19,44% N gef.: 14,31% N

Körper Schmp. $162,5^{\circ}$

3,875 mg Sbst.: 0,576 ccm N (23° , 748 mm)

$C_{22}H_{20}O_4N_6$ ber.: 19,44% N gef.: 16,87% N.

Das bei diesem Versuch verwendete m-Nitrobenzalphenacylhydrazon ($M=283$) lieferte die folgenden Analysen.

Stickstoffbestimmung:

0,8855 mg Sbst.: 1,147 ccm N (20° , 741 mm)

$C_{15}H_{13}O_3N_3$ ber.: 14,84% N gef.: 14,72% N

Kohlenwasserstoff-Bestimmung (Mikro):

0,15045 g Sbst.: 0,35337 g; H_2O : 0,006 g

$C_{15}H_{13}O_3N_3$ ber.: 63,6% C; gef.: 64,06% C

ber.: 4,59% H; gef.: 4,46% H.

Die Daten der Analyse stimmten also mit denen des Ketons überein. Es stand noch die Möglichkeit zur Erwägung, daß im Körper vom Schmp. 129° eine Kristallalkohol enthaltende Form des Ketohydrazons vorlag. Dies war jedoch nicht der Fall gewesen, wie eine Gewichtsbestimmung vor und nach dem Trock-

nen ergab. Die fein pulverisierte Substanz erhitzte ich 1 Std. lang im Trockenschrank auf 80°:

Gewicht vor dem Trocknen: 5,400 g

Gewicht nach dem Trocknen: 5,400 g

Das Analyseergebnis findet hierdurch also eine Bestätigung und es dürfte sich bei dem Körper vom Schmp. 129° (Zerf.) also tatsächlich um das *Stereo-Isomere des Ketons* handeln, das, wie ich fand, auch bei der katalytischen Einwirkung von Schwefelwasserstoff durch Umlagerung (vgl. auch *Busch, Friedenberger und Tischbein*, B. 57, II, 1783) entsteht.

Die Daten der oben angeführten Analysen beweisen, daß das zur Anwendung gelangte m-Nitrobenzalphenacylhydrazin vollkommen rein gewesen ist, ebenso wie auch das p-Nitrophenyl-N-Methylhydrazin, dessen Schmp. 158° mit dem von *Brecht*²⁰⁾ u. a. angegeben übereinstimmte. Das Mißlingen des Versuchs ist demnach nicht auf Unreinheit der Ausgangsmaterialien zurückzuführen.

Der Versuch brachte jedoch insofern etwas Neues, als sich das dabei entstandene Produkt vom Schmp. 129° (Zerf.) identisch erwies mit dem durch Umlagerung des m-Nitrobenzalphenacylhydrazons mit Schwefelwasserstoff erhaltenen Produkt vom Schmp. 128,5° (Zerf.). Ein Mischschmelzpunktsversuch ergab keine Depression. Die Kristallform ist bei beiden Körpern die nämliche, es sind kanariengelbe, feine, verzweigte Nadelchen.

Stickstoffbestimmung des umlagerten m-Nitrobenzalphenacylhydrazons, Schmp. 128,5° (Zerf.):

0,6101 mg Subst.: 0,774 ccm N (20°, 739 mm)

C₁₅H₁₃O₃N₃ ber.: 14,84% N gef.: 14,80% N.

2. Umlagerung des m-Nitrobenzalphenacylhydrazons.

Versuch: 1 g m-Nitrobenzalphenacylhydrazon wird in der Kälte in reichlich Chloroform gelöst und mit soviel Alkohol versetzt, daß eine Wiederausfällung des Ketons eben noch unterbleibt. Sollte doch Trübung auftreten, so wird sie mit wenig Chloroform wieder beseitigt. Es wird nun 2 Minuten lang Schwefelwasserstoff (etwa 2—3 Blasen in der Sekunde) eingeleitet, und

20) Brecht, *Diff.* 1937, S. 25; Ciusa u. Rastelli, *Gaz. chim. ital.* 52, II, 127.

die Lösung über Nacht verschlossen stehen gelassen. Dann ließ ich das Chloroform abdunsten.

Auf diese Weise erhielt ich in drei Fraktionen 0,99 g eines Rohproduktes von der gleichen kanariengelben Farbe und der gleichen Kristallstruktur (verfilzte Nadelchen), wie das Keton.

Nach öfterem Umkristallisieren aus Benzol hatte es den Schmp. 128,5⁰ unter Zersetzung²¹⁾.

Stickstoffbestimmung:

6,101 mg Sbft.: 0,774 ccm N (20⁰, 739 mm)


C₁₅H₁₅O₃N₃ ber.: 14,84% N gef.: 14,80% N

Die Analyse bestätigt also, daß der Körper ein Isomeres des Ketons ist. Rein theoretisch gesehen, konnten bei Kondensation des m-Nitrobenzalphenacylhydrazons mit Hydrazin, weitere Isomere entstehen. Dies brachte aber gleichzeitig unvorhergesehene Komplikationen mit in den Verlauf der Reaktion, sodaß ich mich entschloß, nach Beendigung der laufenden Versuche das Keton bei meinen weiteren Arbeiten nicht mehr zu verwenden.

Ich begann die Schmelzpunktsbestimmungen bei Zimmertemperatur, und steigerte in der Minute um zwei Grad. Dabei zeigten beide Substanzen, nebeneinander erhitzt, das gleiche Verhalten: sie schmolzen unter Gasentwicklung zwischen 128,5 und 129⁰.

a) Versuch zur Kondensation des umgelagerten m-Nitrobenzalphenacylhydrazons mit p-Nitrophenyl-N-Methylhydrazin.

Ist durch die Einwirkung des Schwefelwasserstoffs auf die Chloroform-Alkohol-Lösung des Ketons mit diesem eine Umlagerung vor sich gegangen, so kann sie sich nur nach folgender Gleichung abgespielt haben:



I. Schmp. 147⁰ (Zerf.)

II. Schmp. 128,5⁰ (Zerf.)

Dem Keton Schmp. 128,5⁰ (zerf.) käme also Formel II zu. Bei dieser Konfiguration des Ketons ist erfahrungsgemäß eine Kondensation unter Hydrazonbildung erschwert.

²¹⁾ Identität dieses Produktes mit dem auf S. 38 gefundenen vom Schmp. 129⁰.

Versuch: Zu 0,3 g des Ketons, gelöst in Chloroform, werden 0,18 g Hydrazin ebenfalls in Chloroform gelöst, gegeben. Das Reaktionsgemisch wird nun 16 Std. bei Zimmertemperatur stehen gelassen; 2 Tropfen Eisessig sollen die Kondensation beschleunigen. Nach der bekannten Weiterverarbeitung der Reaktionslösung erhielt ich 0,28 g, d. h. 93,3 % des Ketons unverändert zurück (Schmp. 126° Zerf.), sowie noch 0,09 g eines zwischen 138° und 140° unter Zersetzung schmelzenden anderen Produktes, das ich nicht weiter untersuchte. Resultat: Keine Kondensation.

b) Versuch zur Kondensation des umgelagerten m-Nitrobenzalphenacylhydrazons mit Phenylhydrazin.

Dieser Versuch zeitigte das gleiche Ergebnis wie der vorhergehende: es wurde keine Kondensation erzielt. Ich setzte wie folgt an:

0,25 g m-Nitrobenzalphenacylhydrazon (Schmp. 120,5° zerf.) gelöst in 15 ccm Alkohol und 8 ccm Chloroform und

0,1 g (10 % Überschuß) Phenylhydrazin, gelöst im gleichen Volumen Alkohol unter Zugabe von 1 Tropfen Eisessig. Beide Lösungen werden noch warm miteinander vermischt. Das beim Abkühlen ausfallende Produkt, 0,2 g, weist nach Umkryst. aus Benzol den gleichen Schmp. auf, wie das Ausgangsketon nämlich 128,5° (Zerf.).

c) Versuch zur Kondensation des umgelagerten m-Nitrobenzalphenacylhydrazons Schmp. 128,5° (zerf.) mit Methylphenylhydrazin.

Versuch: 0,9 g umgelagertes Keton löste ich in siedendem Chloroform, gab hierzu 0,5 g Methylphenylhydrazin (10% Überschuß) sowie die methyllkoholische Lösung von 2 g Chlorzink. Ich erhielt ca. 0,5 g eines rötlichen Produktes, das nach öfterem Umkrystallisieren aus Alkohol bei 111° schmolz. Aus den letzten Ölen der Reaktionslösung krystallisierten nach längerem Stehen schöne, farblose Drüsen aus, jedoch in sehr geringer Menge. Nach dem Umkrystallisieren aus Alkohol hatten sie den Schmp. 77—78°.

Stickstoffbestimmung: Körper Schmp. 111°.

4,428 mg Sbst.: 0,67 ccm (20°, 717 mm)

C₂₂H₂₁O₂N₅ ber.: 18,09% N; gef. 16,63% N,

Stickstoffbestimmung: Körper Schmp. 77—78°;
5,109 mg Sbft.: 0,529 ccm (20°, 735 mm)
 $C_{22}H_{21}O_2N_5$ ber.: 18,09 % N; gef.: 11,67 % N.

3. Darstellung von p-Nitrobenzalphenacylhydrazon.

1,2 g gut getrocknetes Phenacylhydrazin werden in ca. 15 ccm Alkohol suspendiert und mit 3 Tropfen Eisigsäure²²⁾ versetzt und die möglichst concen trierte Lösung von 1 g p-Nitrobenzaldehyd in Alkohol hinzufügt. Nach zweistündigem Stehen wird der bräunlichgelbe Krystallbrei abgesaugt und aus Benzol umkrystallisiert; Schmp. 150—151° unter Zersetzung. Das Produkt, feine gelbe Nadelchen, ist löslich in Methylalkohol, Äthylalkohol und Benzol, spielend leicht löslich in Chloroform. Ausbeute 60% der Theorie.

Stickstoffbestimmung:

2,800 mg Sbft.: 0,378 ccm N (21,5°, 733 mm)
 $C_{15}H_{13}O_3N_3$ ber.: 14,98 % N gef.: 15,0 % N.

a. Versuch zur Kondensation des Ketons mit Methylphenylhydrazin in Lösung.

Zu der noch warmen Lösung von 2 g Keton in Chloroform werden 2 g Hydrazin gegeben; das Reaktionsgemisch bleibt 16½ Std. verschlossen stehen. Ich verarbeitete es wie bekannt weiter, und erhielt 1,9 g d. i. 95% unverändertes Keton zurück, das nach dem Umkrystallisieren aus Benzol bei 154° schmolz.

Resultat: Es trat keine Kondensation ein.

b) Versuch zur Kondensation des Ketons mit Methylphenylhydrazin durch Zusammen schmelzen der Komponenten.

Zu 0,05 g des im Reagensglas befindlichen p-Nitrobenzalphenacylhydrazons werden 0,05 g Methylphenylhydrazin (100%), zur besseren Durchmischung in Petroläther gelöst, gegeben, und im Schwefelsäurebad langsam erhitzt. Bei 150° trat Schmelze unter Gasentwicklung ein. Das im oberen Teil des Rohres kondensierte Wasser wurde dauernd mit Filtrierpapier entfernt. Nach dem Aufnehmen der Schmelze in Chloroform, worin sie sehr leicht löslich ist, und Zugabe des 1½ fachen Volumens Alkohol

²²⁾ Eisessig verursacht Zersetzung des Hydrazons, Busch u. Först, J. p. Ch. 119, Külpert Diss.

erhielt ich ein bräunlich-gelbes Pulver das wie das Keton bei 154° unter Zersetzung schmilzt. Keine Kondensation.

Das gleiche Ergebnis zeigte ein Versuch, bei dem das Gemisch der beiden Komponenten 3 Minuten lang im siedenden Wasserbad erhitzt wurde. Es erfolgte keine Schmelze.

c) Umlagerung des p-Nitrobenzalphenacylhydrazons.

0,4 g des Ketons werden in Chloroform in der Kälte gelöst und mit dem gleichen Volumen Alkohols versetzt. Nach dem Einleiten von Schwefelwasserstoff usw., (wie S. 30 beschrieben), bleibt die Lösung ca. 20 Std. verschlossen im Dunkeln stehen. Ich erhielt 0,3 g, also 75% des Ketons als umgelagertes Produkt, das bei 141° unter Zersetzung schmolz.


Stickstoffbestimmung:

4,088 mg Sbft.: 0,553 ccm N (21°, 730 mm)

C₁₅H₁₅O₃N₃ ber.: 14,84% N gef.: 14,74% N.

4. Kondensationsversuche mit p-Chlorbenzalphenacylhydrazon.

Darstellung des p-Chlorbenzal-phenacylhydrazons.



0,9 g p-Chlorbenzaldehyd werden in 10 ccm abs. Alkohols gelöst und mit 3 Tropfen Essigsäure versetzt. Nun wird allmählich 1 g Phenacylhydrazin in kleinen Portionen hinzugefügt, wobei jedesmal gut zu schütteln ist. Die anfänglich rote Lösung erstarrt nach kurzer Zeit ganz plötzlich zu einem dicken Kristallbrei. Nun werden nochmal 2 ccm abs. Alkohols zugefetzt und dann bis zum Sieden erhitzt. Ausbeute: 65—70% der Theorie. Fast farblose feine Nadelchen mit schwach gelblichem Schimmer. Nach dem Umkristallisieren aus Methylalkohol hatte das Produkt den Schmp. 97°; es zerfällt dabei nicht so spontan wie z. B. das m-Nitrobenzalphenacylhydrazon, sondern erst einige Zeit nach dem Schmelzen. Außerdem erhielt ich noch in geringer Menge einen gleichfalls schwach gelblichen Körper vom Schmp. 207°, welcher beim Lösen des Hauptproduktes in Methylalkohol als

Rückstand hinterbleibt. Von einer näheren Untersuchung desselben nahm ich Abstand, da es sich, wie der hohe Schmelzpunkt zeigt, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um ein Hydrazon handeln konnte.

Stickstoffbestimmung:

8,203 mg Sbft. 0,752 ccm N (19°, 740 mm)

$C_{15}H_{13}ON_2Cl$ ber.: 10,29% N gef.: 10,43% N.

Wie ich durch einen weiteren Versuch ermittelte, wird die Hydrazon-Ausbeute nicht beeinträchtigt, wenn die Kondensation bei Zimmertemperatur vorgenommen wird, die Reaktionslösung also nicht zum Sieden erhitzt wird. Auch hier entstand das hochschmelzende Produkt.

Kondensation des p-Chlorbenzalphenacylhydrazons mit Methylphenylhydrazin.

0,26 g des Ketons werden in möglichst wenig Alkohol-Chloroform gelöst und mit 0,12 g Methylphenylhydrazin und 1 Tropfen Eisessig versetzt. Nach 48-stündigem Stehen hatten sich tiefrot gefärbte Krystalle in sehr geringer Ausbeute aus der Lösung abgeschieden. Ich verarbeitete die Lösung wie schon beschrieben weiter, und erhielt als einziges Produkt ca. 0,07 g d. i. 18% der Theorie des oben erwähnten Körpers in rötlichen Blättchen, der nach dem Umkrystallisieren aus Chloroform-Alkohol bei 100° schmolz.


Stickstoffbestimmung:

3,647 mg Sbft.: 0,497 ccm N (24°, 739 mm)

$C_{22}H_{21}N_4Cl$ ber.: 14,9% N gef.: 15,21% N.

Eine zweite Form des Hydrazons zu finden gelang mir leider nicht, trotzdem ich den Versuch öfter wiederholte. Ein Versuch, die Umlagerung des p-Chlorbenzalphenacylhydrazons mit Schwefelwasserstoff zu erreichen, blieb ergebnislos. Ich erhielt 100% des Hydrazons im festen Zustand wieder zurück.

5. Versuch zur Kondensation des o-Oxybenzalphenacylhydrazons mit Methylphenylhydrazin.



o-Oxybenzalphenacylhydrazon erhielt ich nach der Vor-

(Schrift von *Busch* und *Foerst*²³⁾, welche es erstmals darstellten, aus Phenacylhydrazin und Salicylaldehyd in alkoholischer Lösung, die mit 1 Tropfen Eisessig angeäuert war. Unterläßt man jedoch, entgegen der zitierten Vorschrift, das kurze Aufsieden der Reaktionslösung, so gelingt es, die Ausbeute an Ketohydrazon zu steigern. Analog der Vorschrift arbeitend, bekam ich eine Ausbeute von 57%, wogegen ich, die Reaktionslösung über Nacht im Eischrank stehen lassend, eine solche von fast 100% erhielt.

Versuch: 0,5 g o-Oxybenzalphenacylhydrazon und 0,25 g Methylphenylhydrazin werden in der Kälte in möglichst wenig Chloroform gelöst und mit 1 Tropfen Eisessig versetzt. Das Gemisch bleibt 18 Std. verschlossen im Dunkeln stehen. Nach Ablauf dieser Zeit hatte sich aus der rötlich gefärbten Lösung noch nichts abgeschieden. Ich entfernte nun das Chloroform im Vakuum und gab das 1½ fache Volumen Alkohols hinzu. Ich erhielt 50% Keton als I. und II. Fraktion unverändert zurück, und fand als III. und IV. Fraktion zwei Körper, die ich aus Alkohol leicht rein erhielt. III. Schmp. 70° sehr wenig; IV. Schmp. 140—149°, 0,05 g gelbes feinkrySTALLINES Pulver, das sich jedoch leider nicht als das erwartete Hydrazon erwies, wie die Analyse zeigt:

Stickstoffbestimmung:

3,167 mg SbSt.: 0,517 ccm N (22°, 729 mm)

C₂₂H₂₂ON₄ ber.: 15,64% N gef.: 18,12% N.

Umlagerung des o-Oxybenzalphenacylhydrazons.

Alle Versuche, die Umlagerung unter der Einwirkung von Schwefelwasserstoff herbeizuführen, brachten keinen Erfolg.

6. Kondensationsversuche mit Benzalphenacylhydrazon.



Das Ketohydrazon wird nach *K. H. Küspert*²⁴⁾ folgendermaßen dargestellt:

„1 g Phenacylhydrazin wird in 8 ccm Alkohol suspendiert, unter Durchschütteln 0,75 g Benzaldehyd zugetropft und

²³⁾ J. p. Ch. 119, 296.

²⁴⁾ Dissertation 1929, Erlangen. S. 29.

zur Beschleunigung der Kondensation noch 1 Tropfen Eisessig hinzugegeben. Dabei geht das Hydrazin bald in Lösung, während nunmehr das Hydrazon zur Abscheidung kommt. Aus konz. Lösung in Benzol fällt es in farblosen Prismen an. Schmp. 94° . Ausbeute 80—90% der berechneten. Aus Alkohol kristallisiert die Substanz in Blättchen. Leicht löslich in Benzol und Eisessig, löslich in Alkohol und Äther, kaum löslich in Petroläther.“

Zu Anfang mißlingen mir alle Versuche, diesen Körper zu synthetisieren; wahrscheinlich ist der Zusatz von Eisessig von Übel, gegen den Phenacylhydrazin sehr empfindlich ist.

Ich fügte also den Tropfen, mehr zur Vollendung der Reaktion, erst hinzu, als das Hydrazin in Lösung gegangen war. Wesentlich ist m. E. auch ein dauerndes Umschütteln der Reaktionsflüssigkeit, und zwar so lange, bis das Hydrazon auszukristallisieren beginnt.

Es kamen folgende Mengen in Ansatz:

1,3 g Benzalphenacylhydrazon, gelöst in ca. 18 ccm Alkohol und 4 ccm Chloroform

0,7 g Methylphenylhydrazin.

Ich teilte nun die Lösung in drei gleiche Teile und versetzte

a) mit 2—3 Tropfen Eisessig

b) mit 0,1 g Chlorzink

c) mit 0,1 g Bor säure

} gelöst in wenig Methylalkohol

und ließ ca. 18 Std. verschlossen stehen.

a) Aus diesem Teil konnte ich überhaupt kein kristallisiertes Produkt erhalten. Das entstandene Öl trotzte allen meinen Bemühungen.

b) Fraktion I, 0,1 g schwach bräunlich gefärbter Nadeln; nach Umkristallisieren aus Alkohol Schmp. 103°

Fraktion II, wenig, Schmp. 103°

Stickstoffbestimmung Körper Schmp. 103° :

3,41 mg Sbft.: 0,41 ccm N (24° , 739 mm)

$C_{22}H_{23}N_4$ ber.: 16,32 N, gef.: 13,44 N.

Die Reaktion war also nicht den Erwartungen entsprechend verlaufen.

Die Analyse stimmte jedoch auf das Benzal-methylphenyl-hydrazon, $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH}=\text{N} \cdot \text{N} \begin{smallmatrix} \text{CH}_3 \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{smallmatrix}$, $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{N}_2$, ber.: 13,33% N, das sich analog wie in früheren Fällen (vergl. S. 25) das m-Nitrobenzal-benzylphenyl-hydrazon, gebildet hatte. Benzal-methylphenyl-hydrazon ist in der Literatur bekannt; die Autoren geben 104,5° und 102–102,5° als Schmp. an. Nach *Elbers*²⁵⁾ entsteht es aus Benzaldehyd und Methylphenylhydrazin und gibt, mit einem Kryställchen Chloranil in ätherischer Lösung erhitzt, eine Blaufärbung. Da auch mein Produkt diese Färbung lieferte, war der Reaktionsverlauf geklärt.

Die öligen Reste der Reaktionsflüssigkeit konnte ich nicht zur Krystallisation bringen.


Aus c) endlich, erhielt ich nach der bekannten Methode lediglich 0,25 g des Ketons, d. i. ca. 55%. Die letzten Öle waren, wie der auftretende Geruch nach Isouitril bewies, weitgehender Zersetzung anheimgefallen und lieferten keine krystallisierten Produkte mehr.

Resultat: Das Benzalphenylhydrazon gibt wohl mit primären Hydrazinen die erwarteten Doppel-Hydrazone, wie *Busch* und *Küspert*²⁶⁾ bereits zeigen konnten, nach meinen Versuchen aber nicht mehr mit sekundären Hydrazinen.

B. Darstellung von Hydrazonen anderer Phenacylamine mit den gleichen Hydrazinen und Chlorzink.

1. Verwendung von m-Nitroacetophenon.

a) Darstellung des m-Nitroacetophenon-methylphenylhydrazons.²⁷⁾



Versuch: Es kommen folgende Mengen in Ansatz:

- 1,0 g Keton, in heißem Alkohol gelöst
- 0,8 g Methylphenylhydrazin (10% Überschuß)
- 2,0 g Chlorzink, gelöst in Methanol

25) A 227, 352.

26) J. p., Ch. 144, 279.

27) Koenig, Dissertation Erlangen 1935, S. 33.

Nach ca. 5 stündigem Stehen resultiert ein Öl von fast roter Farbe, leicht löslich in Äther, löslich in Petroläther, schwer löslich in Alkohol und Benzol. Aus möglichst conc. ätherischer Lösung erfolgt auf Zusatz von wenigen Tropfen Alkohol und Reiben mit Glasstab spontane KrySTALLISATION, während alle Versuche, aus benzolischer Lösung eine Abcheidung zu erhalten, scheiterten. Nach dem UmkrySTALLISIEREN aus Alkohol hat das Produkt den Schmp. 67/80° 27). Aus Benzol erscheint es in derben, orangeroten säulenförmigen Prismen, aus Alkohol, besonders auf Zusatz von wenig Wasser, in hellen gefärbten Nadelchen. Eine zweite Form konnte ich trotz aller Bemühungen nicht finden.

Auch hier wieder ist die kondensationsfördernde Wirkung des Chlorzinks ersichtlich: in vorstehend beschriebenen Versuch erhielt ich bei nur 5 stündiger Reaktionsdauer 0,95 g Hydrazon, d. i. 53% der Theorie; in einem zweiten Versuch, bei 13 1/2 stündiger Reaktionsdauer 78% der Theorie an gereinigtem Produkt, während Koenig (loc. cit.) bei einer Reaktionsdauer von 48 Std. und Verwendung von Eisessig als Kondensationsmittel, nur 70,5% Rohausbeute findet. Es ist zweckmäßig, wenn man die Kondensationsprodukte, die bei Gegenwart von Chlorzink anfallen, noch vor dem UmkrySTALLISIEREN auf Zink prüft und event. letzteres mit NH₃ entfernt.

Stickstoffbestimmung:

7,065 mg Sbft.: 0,990 ccm N (20°, 739 mm)

C₁₅H₁₅O₂N₃ ber.: 15,61% N; gef.: 15,87% N.

b) Darstellung des m-Nitroacetophenon-benzylphenyl-hydrazons.²⁸⁾

1,0 g m-Nitroacetophenon in möglichst wenig heißem Alkohol gelöst, und

1,3 g Benzylphenylhydrazin (10% Überschuß)

1,0 g Chlorzink, gelöst in Methanol.

Nach 7 Std. hatte sich ein hellbraunes Öl abgeschieden, welches in wenig Alkohol gelöst wird. Auf Zusatz einiger Tropfen Äther und Reiben mit dem Glasstab erfolgt wiederum spontane KrySTALLISATION. Gelbe, säulenartige Prismen, die, aus Alkohol umkrySTALLISIERT, bei 87° schmelzen. Aus der alkoholischen Reaktionslösung kann nach Verdünnen mit Wasser noch eine kleine Menge

27) Koenig, loc. cit.

28) Koenig, loc. cit.

des Produktes erhalten werden. Eine zweite Form des Hydrazons konnte ich, entgegen den Angaben *Koenigs*, auch hier nicht finden. Es ist dies möglicherweise eine Wirkung des Chlorzinks, welches demnach die Reaktion in Richtung der n-Form leitet.

Bei nur 7stündiger Reaktionszeit erhielt ich eine Ausbeute von 65% des reinen Produktes, während *Koenig* nach der dreifachen Zeit eine Rohausbeute von 91,6% erzielt, unter Anwendung von Eisessig als Kondensationsmittel.

Stickstoffbestimmung:

5,292 mg Sbft.: 0,585 ccm N (20°, 739 mm)


C₂₁H₁₉O₂N₃ ber.: 12,2% N gef.: 12,48% N.

2. m-Aminoacetophenon und Methylphenylhydrazin.

Um das Hydrazon zu erhalten, vermischte ich die alkoholische Lösung von 1 g Keton mit der methylalkoholischen Lösung von 0,5 g Chlorzink und fügte nun 1 g Hydrazin (10% Überschuß) hinzu. Aus der Reaktionsflüssigkeit gewann ich nach bekannter Methode ein helles Öl, das sich in der Kälte leicht abscheidet und in Äther löslich ist. Leider gelang es mir nicht, nennenswerte Mengen eines kristallisierten Produktes zu erhalten.

Resultat: Während *Koenig* (loc. cit.) mit diesem Keton und Phenylhydrazin das erwartete Hydrazon erhielt, scheint in meinem Fall, wo sekundäres Hydrazin zur Anwendung kommt, die Tendenz zur Hydrazon-Bildung außerordentlich gering zu sein. Diese Beobachtung machte ich im Verlauf der Arbeit noch öfter.

3. Acetyl-m-aminoacetophenon-methylphenylhydrazon.



Ich erhielt das Acetyl-m-aminoacetophenon²⁹⁾ durch Kochen des in Eisessig gelösten m-Aminoacetophenons mit Essigsäureanhydrid auf dem Wasserbad. Nach 1/2 Std. ist die Reaktion beendet und der Eisessig und das unverbrauchte Anhydrid werden

²⁹⁾ H. Rupe, A. Braun u. K. v. Zembruski, B XXXIV, III, 3523.

im Vakuum abdestilliert. Im Rückstand befindet sich das Keton, das aus verdünntem Alkohol rein erhalten wird. Es bildet weiße Prismen oder Nadeln die bei 128—129° schmelzen.

Zur alkoholischen Lösung von 1 g Keton werden 0,7 g Hydrazin (10% Überschuß) und 0,5 g Chlorzink, gelöst in Methylalkohol, gegeben. Nach ca. 20stündigem Stehen wurde von dem entstandenen gelblich-braunen Öl abgegossen; ein aus der mit Petroläther versetzten benzolischen Lösung dieses Öls entstandener amorpher Niederschlag erwies sich als zinkhaltig (Probe auf dem Platinblech). Aus der mit wenig Äther versetzten concentrirten alkoholischen Lösung des Öls schieden sich orangefarbene Drußen ab, die aus strahlenartig angeordneten Nadelchen bestanden. Auf diese Weise wurde 1 g dieses Produktes erhalten, welches nach dem Umkrystallisieren aus Methanol bei 141° schmolz. Einige der sehr großen derben Krystalle sind von mehr rötlicher Farbe; in pulverisiertem Zustand liefern sie aber den gleichen Schmelzpunkt wie die übrigen.

Es gelang mir nicht eine zweite Form des Hydrazons zu finden. Vermutlich lenkt auch hier das Chlorzink die Reaktion in Richtung der stabileren Form.

Stickstoffbestimmung:

3,815 mg Sbft.: 0,496 ccm N (17°, 747 mm)

$C_{17}H_{19}ON_3$ ber.: 14,94% N, gef.: 15,04% N.

4. m-Nitrophenacyl-p-toluidin-methylphenylhydrazon.

Bei der Darstellung³⁰⁾ des m-Nitrophenacyl-p-toluidins geht man vom m-Nitrö-phenacylbromid, das man durch Nitrierung von Phenacylbromid mit rauchender Salpetersäure erhält³¹⁾, und p-Toluidin aus. Beide Komponenten werden in alkoholischer Lösung mit 1 Tropfen Eisessig zur Reaktion gebracht. Es ist vorteilhaft, die Kondensation unter Wasserkühlung vor sich gehen zu lassen, denn die dabei auftretende recht beträchtliche Wärmetönung kann sehr leicht den Eintritt eines zweiten Phenacyl-Restes begünstigen, sodaß Di-m-Nitrophenacyl-p-toluidin als lästiges Nebenprodukt entstehen würde.

30) E. Schmidt, Dissertation Erlangen 1934, S. 19f.

31) Hunnius, B X, 2008.


Ich erhielt das Hydrazon, den *Schmidt*'schen Angaben gemäß in ca. 80% Ausbeute. Aus Benzol (loc. cit.) haben die schön gelben Nadeln den Schmp. 146°, wobei die rote Schmelze geringe Gasentwicklung zeigt, die aber schon nach einiger Zeit in sehr stürmische Zersetzung übergeht. Ich fand, daß das Produkt mit Benzol krytallisiert. Trotz häufigen Umkrytallisierens aus Benzol erhielt ich anfangs immer nur 138—139°, obwohl die Probe vorher auf Ton getrocknet war. Nachdem ich dann ca. 1/2 Std. bei 90° im Trockenschrank erwärmt hatte, fand ich eine Gewichts-differenz:

vor dem Trocknen 0,4020 g Substanz

nach dem Trocknen 0,3724 g Substanz

Gewichtsverlust 0,0296 g, entprechend ca. 1/4 Mol Benzol. Diese getrocknete Probe ergab nunmehr sofort den Schmp. 146°.

Um das m-Nitrophenacyl-p-toluidin-methylphenylhydrazon



darzustellen, vermischte ich Chloroform-Alkohol-Lösungen beider Komponenten und untersuchte nun die Einwirkungen verschiedener Kondensationsmittel.

Kondensation mit Chlorzink.

1,5 g m-Nitrophenacyl-p-toluidin werden in möglichst wenig Chloroform heiß gelöst, hierauf mit etwa 1/3 des Volumens Alkohol sowie 0,75 g Methylphenylhydrazin (10% Überschuß) versetzt und zum Schluß die methylalkoholische conc. Lösung von ca. 0,1 g Chlorzink hinzugefügt. Etwa 1/3 des Ketons war nach kurzer Zeit wieder ausgefallen; ich brachte es durch Erwärmen wieder in Lösung und ließ nun über Nacht stehen. Nachdem ich das Chloroform im Vakuum abdestilliert hatte, versetzte ich die alkoholische Lösung mit dem ca. 1 1/2 fachen ihres Volumens an Wasser, und soviel conc. Ammoniak, daß die Lösung stark darnach riecht (etwa 5 Tropfen); auf diese Weise wird alles Zink als Ion in Lösung gehalten. Trotzdem aber ist jeder Niederschlag auf dem Platinblech auf Zn zu prüfen. Ist dieses tatsächlich noch anwesend, so krytallisiert man nochmal aus ca. 70%igen Alkohol, den

man mit einigen Tropfen conc. Ammoniak versetzt. Die starke, hellgelbe Trübung konnte ich unter Eiskühlung zur KrySTALLISATION bringen:

Fraktion I, gelbe-schwach bräunliche NÄDELCHEN, 1,0 g, Schmp. 157°, umkrySTALLISIERT aus Alkohol. Ausbeute 44% der Theorie.

Aus der Reaktionslösung fiel noch eine geringe Menge eines bei 146° schmelzenden, gelben Produktes an, das ich auch bei einem anderen Versuch erhielt, jedoch, wie dort erwähnt, nicht das gesuchte Hydrazon ist. Lediglich der Körper vom Schmp. 157° ist, wie die Analyse beweist, die eine mögliche Form des Hydrazons; die andere oder die Racematform zu finden, gelang mir weder in diesem, noch in den folgenden Versuchen. Da die Reaktionslösung bereits nach kurzem Stehen durch den eigenartig widerwärtigen Geruch die Bildung von Isonitril anzeigt, kann dieses negative Resultat eigentlich nicht überraschen: wie bei den Versuchen mit einigen andern Ketonen ebenfalls schon beobachtet, ist auch hier das Keton weitgehender Zersetzung anheimgefallen, sodaß nur die stabile, sich am leichtesten bildende Form des Hydrazons entstand.

Stickstoffbestimmung: (157°)

3,938 mg Sbft.: 0,519 ccm N (23°, 727 mm)

C₂₂H₂₂O₂N₄ ber.: 14,97% N gef.: 14,54% N

Einige weitere Versuche unter geringer Variation der Bedingungen ergaben wieder die Hydrazon-Form Schmp. 157°, deren Identität mit dem vorher gefundenen Körper ich durch Analysen und Mischschmelzpunktsbestimmungen hinreichend sicherstellte.

Versuch ohne Chlorzink.

Das Chloroform-Alkohol-Gemisch von 0,4 g m-Nitrophenacyl-p-toluidin und 0,2 g Methylphenylhydrazin (10% Überschuß) wird 2 Std. auf dem Wasserbad zum Sieden erhitzt und bleibt nun 60 Std. lang verschlossen im Dunkeln stehen. Nach dieser Zeit hatten sich ca. 82% des Ketons als orangegelber KrySTALLBREI aus der Lösung abgeschieden. Nach dem Entfernen des Chloroforms im Vakuum konnte ich noch ca. 0,1 g eines Produktes isolieren, das in Form von roten NÄDELCHEN abgeschieden wurde und nach dem UmkrySTALLISIEREN aus Alkohol bei 146° schmolz. Daß dieser Körper nicht das Keton, das einen Stickstoff-

gehalt von 10,37% hat, sein kann, geht aus der folgenden Analyse hervor.

Stickstoffbestimmung Prod. 1460:

3,707 mg Sbft.: 0,581 ccm N (19°, 731 mm)

gef.: 17,62% N ber.: $\left\{ \begin{array}{ll} \text{für Hydrazon } 14,97\% \text{ N } \text{C}_{22}\text{H}_{22}\text{O}_2\text{N}_4 \\ \text{für Keton } 10,37\% \text{ N } \text{C}_{15}\text{H}_{14}\text{O}_3\text{N}_2 \end{array} \right.$

Resultat: Bei diesem Versuch entstand das oben beschriebene Hydrazon vom Schmp. 157° überhaupt nicht.

Versuch unter Verwendung von Eisessig als Kondensationsmittel.

Es kommen zur Reaktion in heißgesättigter Chloroform-Lösung:

1,5 g m-Nitrophenacyl-p-toluidin

und 0,75 g Methylphenylhydrazin, 1 Tropfen Eisessig.

Nach 6 stündigem Kochen bleibt das Gemisch über Nacht stehen. Am andern Morgen waren 40% des Ketons wieder auskrySTALLISIERT. Ich verfuhr wie üblich und erhielt als II. Fraktion ca. 0,25 g, d. i. 4,5% Ausbeute an Hydrazon der bereits bekannten Form vom Schmp. 157°; als III. Fraktion 0,3 g eines bei 142° schmelzenden, gelben KrySTALLISATS. Die Analyse hatte folgendes Ergebnis:

3,195 mg Sbft.: 0,461 ccm N (24°, 730 mm)

$\text{C}_{22}\text{H}_{22}\text{O}_2\text{N}_4$ ber.: 14,97% N gef.: 15,93% N, also rund 10% zuviel Stickstoff. Um der Reaktionslösung auch die letzten Produkte zu entziehen, versetzte ich sie mit dem gleichen Volumen Wasser, schüttelte einige Male mit Äther aus und ließ nach dem Trocknen mit Pottasche die Lösung langsam verdunsten. Auf diese Weise erhielt ich nochmals 0,05 g des oben analysierten Körpers vom Schmp. 142° in gelblich-braunen Blättchen. Nach mehrtägigem Stehen der Reaktionslösung, welche nun ein dunkles, zähes Öl bildete, trat Isonitrilgeruch auf und trotz aller Bemühungen konnte ich keine KrySTALLISATION mehr erzielen.

5. Phenacyl-methylanilin.



a) Versuch in Lösung.

Darstellung des Ketons, Schmp. 120°.

Nach *Busch* und *Hefele*³²⁾ erhält man Phenacyl-phenyl-me-

³²⁾ J. pr. Ch. 83, 450.

thyl-amin wenn man Monomethylanilin mit Bromaceto-phenon in Alkohol zusammenbringt. Die Verbindung



bildet, aus Alkohol gereinigt, gelbe glänzende Täfelchen vom Schmp. 120° die sich nach einiger Zeit etwas grünlich färben.

1,0 g Phenacyl-phenyl-methyl-amin, gelöst in abj. Alkohol

0,6 g Methylphenylhydrazin (10% Überchuß)

1 Messerspitze Chlorzink, gelöst in Methylalkohol.

Das Reaktionsgemisch wurde 3½ Std. auf dem Wasserbad erwärmt, wobei ich Ammoniak-Entwicklung feststellen konnte; es war also bereits eine Zersetzung des Hydrazins eingetreten. Nach der üblichen Behandlungsweise mit Wasser und conc. Ammoniak erhielt ich als einzige Fraktion 0,8 g eines schwach gelb gefärbten Produktes, das in Blättchen krystallisierte und nach öfterem Umkrystallisieren aus Ligroin den Schmp. 120° zeigte. Durch Schmelzpunkt und Analyse konnte ich einwandfrei nachweisen, daß das Produkt unverändertes Keton war.

Stickstoffbestimmung:


4,164 mg Sbft.: 0,249 ccm N (17°, 722 mm)

C₁₅H₁₅ON ber.: 6,22% N gef.: 6,68% N

b) Versuche zur Kondensation durch Zusammenschmelzen der Komponenten.

Ich führte zwei Versuche durch. Im einen Fall erhitzte ich das trockene Reaktionsgemisch 10 Min. lang auf 100°, im anderen Fall ebenso lange auf 115°. In beiden Fällen entwickelte sich aus der klaren gelben Schmelze in langsamer Blasenfolge Ammoniak (Salmiak-Probe). Geringe Tröpfchenbildung in den kalten Teilen der Reagenzrohre ließen mich vermuten, daß Reaktion eingetreten sei. Der weitere Verlauf der Versuche, welche nach Behandeln der wieder erstarrten Schmelze mit Chloroform und Alkohol die gesamte angewandte Menge des Ketons wieder zurücklieferten, überzeugte mich jedoch, daß dies nicht der Fall sein konnte.

Resultat: Phenacylamine des Typs



kondensieren mit sekundären Hydrazinen also überhaupt nicht mehr, wohl aber, wie *Busch*³³⁾ zeigte, mit primären Hydrazinen unter Bildung der erwarteten Hydrazone.

Vorliegende Arbeit wurde im Institut für angewandte Chemie zu Erlangen angefertigt.

³³⁾ *Busch* und *Hefe*, J. pr. Ch. 83.

*Zum Schluß ist es mir tiefes Bedürfnis, meinem hoch-
verehrten Lehrer, dem*

Herrn Geheimen Regierungsrat Professor Dr. M. Busch

*besonders an dieser Stelle für die äußerst wertvolle
Unterstützung, die er mir durch Rat und Tat in jeder
Hinsicht bei der Ausführung der Arbeit hat zuteil
werden lassen, meinen ganz ergebensten Dank aus-
zusprechen.*

Lebenslauf.

Am 21. September 1908 wurde ich geboren zu Lauf a. P. als Sohn des Fabrikbesitzers Dipl. Ing. Robert Buchner und seiner Ehefrau Anna, geb. Meier. Nach dem Besuch der Volksschule trat ich in das Real-Reformgymnasium Nürnberg über und erhielt dort im Frühjahr 1927 das Reifezeugnis. Ich immatrikulierte mich im Sommersemester 1927 an der Technischen Hochschule zu München, um Chemie zu studieren. Im Jahre 1931 übersiedelte ich an die Universität Erlangen und setzte hier am Institut für angewandte Chemie mein Studium fort. Ich legte dort im Juli 1934 das zweite Verbandsexamen ab, und bin seither mit der Anfertigung meiner Doktorarbeit beschäftigt gewesen
